

## 咬耳 (EAR BITING)

### 病因一

- (1) 會造成豬隻咬耳的原因和咬尾類似相當複雜，是受多種因素所影響，兩者均屬惡癖。任何會引起豬隻不安、恐懼或心理不平衡的因子都是造成咬尾的病因（圖 A）。
- (2) 病因詳述請參閱肥育前期-12 咬尾。

### 病變與危害一

- (1) 咬耳比咬尾易被業者忽視，且可能因剪耳號而使咬耳加重。
- (2) 早期離乳的豬場發生率高，豬齡達 12 週以後發生頻率下降。
- (3) 咬耳之部位主要是在耳尖與耳翼兩處。豎立的耳朵較多咬在耳尖（圖 B、C、D），厚重下垂之耳多咬傷耳翼（圖 A、B、D、E）。
- (4) 咬傷多發生於兩側，亦有僅咬單側者。
- (5) 起初只對耳部做溫柔的吸吮或輕咬，當產生皮膚受傷流血時，施暴豬即重咬與進逐。
- (6) 病變輕微的咬耳傷口可自癒，但嚴重時，一耳或兩耳尖端可能被咬掉（圖 A~F）。
- (7) 咬耳不可輕忽，被咬的傷口應儘速止血及消毒，預防細菌性感染而轉成壞死或壞疽，甚至造成敗血症（圖 E、F）。

### 診斷一

- (1) 臨床典型病變。
- (2) 全面檢查畜舍的環境、通風、床面及供水。
- (3) 飼料成份檢驗及分析。

### 類症鑑別一

任何會造成耳朵血管栓塞的疾病與中毒，如沙氏桿菌症與黴菌毒素（參角中毒）。

### 防治策略一

- (1) 找出「兇手」豬加予隔離。
- (2) 受傷的耳朵止血、清理、消毒或抗生素治療。病豬集中隔離，妥善護理。
- (3) 找出致病原因，可以防止日後發生咬耳。

### 咬耳 (EAR BITING)



圖A 任何會引起豬隻不安、恐懼或心理不平衡的因子都是造成咬耳的病因。



圖B 豎立的耳朵較多咬在耳尖，厚重下垂的耳朵多咬在耳翼。



圖C 咬耳之部位主要是在耳尖與耳翼兩處。豎立的耳朵較多咬在耳尖。



圖D 豎立的耳朵大多咬在耳尖，本圖右側為輕度且剛發生的咬耳，左邊的是已自癒的咬耳。



圖E 被咬的傷口應儘速止血及消毒，預防細菌二次性感染而癒後不良。



圖F 咬耳的病灶很難和沙氏桿菌症與麥角中毒造成的耳壞疽做肉眼鑑別診斷。