

## 九、體腔



圖 9-1 腹水症。屠體的腹部明顯腫大且下垂，按壓有波動感。



圖 9-2 腹水症。屠體剖開腹腔可見大量黃色透明清澈液體。



圖 9-3 腹水症。腹部腫脹的鴨隻打開體腔時，可見多量的黃色清澈液體蓄積。腹水症與感染無關。




圖 9-4 墜卵性腹膜炎。剖開體腔可見成熟的卵泡充、出血，卵管、卵巢輸和腸管互相粘連，以及大量黃色混濁的液體蓄積。



圖 9-5 墜卵性腹膜炎。剖開腹腔，可見成熟的卵泡充血（左下方），大小腸充、出血以及互相黏連，在圖中央可發現數個已經破裂呈碎片狀的硬固卵膜。



圖 9-6 墜卵性腹膜炎。剖開體腔，可見體腔中有卵黃樣黏稠性腹水蓄積，並可見上方的破碎卵膜。



圖 9-7 纖維素性腹膜炎。又稱新鴨病，內臟包括心、肝、胃以及腸管的表面被白色或黃色的纖維素性滲出物覆蓋與互相黏連。病原是雷氏菌，可介卵感染，但一般經由呼吸道感染。




圖 9-8 纖維素性腹膜炎。又稱新鴨病，從屠體摘出的臟器，可見心、肝臟以及大小腸被不等量的黃色固體樣的滲出物覆蓋，造成臟器的粘連。



圖 9-9 尿酸鹽沉著（痛風）。罹病鵝之心臟與肝臟表面覆蓋有厚度不一的粉筆灰樣結晶塊。



圖 9-10 網狀內皮增殖症。病鵝剖檢時發現心、肝、脾臟腫大且見大小不一的白色腫瘤結節。